

Lakossági Tájékoztató

Amit tudni kell a COVID 19 Moderna Vakcináról

2021.08.02.

COVID 19 Moderna Vakcina vakcina összetétele

A vakcina a vírus molekuláris szerkezetén alapuló technológia segítségével készült. Az oltóanyag mRNS-alapú, egy lipid nanorészecskébe csomagolt RNS molekulát (mRNS) tartalmaz.

Hogyan véd a vakcina?

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen.

Kinél alkalmazható a védőoltás?

COVID 19 Moderna Vakcina 12 éves és idősebb személyeknél alkalmazható.

Okoz –e betegséget a vakcina?

Mivel a COVID 19 Moderna Vakcina nem a vírust tartalmazza az immunitás kiváltásához, így nem okozhat Önnek COVID-19-betegséget.

Hány adag szükséges a védettséghez?

2 adag, 28 nap különbséggel.

A védettség a második adag után kb. a 14 napon alakul ki.

Meddig tart a védettség?

A vakcina által biztosított védelem ideje még nem ismert, meghatározása folyamatban van a jelenleg zajló klinikai vizsgálatok során.

Felcserélhetőség

A COVID 19 Moderna Vakcina nem cserélhető fel más COVID-19 elleni oltóanyagokkal.

Kaphat-e oltást aki átesett COVID 19 betegségen?

A teljes gyógyulást követően nincs ellenjavallata az oltás beadásának.

Szükséges-e antigén gyorsteszt végzése az oltás beadása előtt?

Az oltás előtt nem szükséges antigén gyorsteszt.

Kaphat-e oltást, aki krónikus, alapbetegséggel rendelkezik?

Igen, az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható, akiknél nem áll fenn oltásra vonatkozó kontraindikáció.

Beadható-e együtt másik védőoltással?

A COVID 19 Moderna Vakcina más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be.

Másik védőoltás legalább 14 napos időközzel adható.

Hogyan történik az oltás?

A védőoltás beadása oltási terv alapján történik majd a kijelölt oltópontokon.

Az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív segítségével kikérdezi és megvizsgálja.

Az oltás beadásáról minden esetben az oltóorvos dönt.

Az oltás ellenjavallatai

Akut lázas betegség.

A COVID-19 Vaccine Moderna vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció.

A COVID-19 Vaccine Moderna első adagjára anafilaxiás reakcióval reagáló személyeknek nem adható be a vakcina második adagja.

Az anamnézisben súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel vagy védőoltással kapcsolatos anafilaxiás reakció.

Várandósság

A Moderna-vakcina várandósság alatt is adható. Lásd. <https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itt-szakmai-ajanlas-varandosok-kerhetik-az-oltast>

Szoptatás alatt beadható-e a védőoltás?

Nem ismert, hogy a vakcina kiválasztódik-e a humán anyatejbe.

Akik kockázati csoportba tartoznak és igénylik az oltást a szoptatás ideje alatt is megkaphatják.

Az oltás után kialakulhatnak mellékhatások (oltási reakciók)?

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. A lehetséges oltási reakciókra az oltóorvos is fel fogja hívni a figyelmet.

Milyen mellékhatások (oltási reakciók) várhatóak?

Oltási reakciók lehetnek: fájdalom és duzzanat a beadás helyén, fáradtságérzés, fejfájás, izomfájdalom, ízületi fájdalom, hidegrázás, láz esetleg bőrpirosodás az injekció beadásának helyén, émelygés.

Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók, rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén.

Mivel lehet kezelni az oltási reakciót?

A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer (pl. paracetamol, ibuprofen, metamizol) alkalmazható. Ezek azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények nélkül megszűnnek.

Hová lehet jelenteni oltási reakciót?

Oltási reakciót lehet jelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas

Oltási reakciót a Nemzeti Népegészségügyi Központnak is lehet jelenteni.